

FEVRIER

Taille

Enlever le bois mort, les fruits momifiés et les gourmands, donnez de l'air !!!

Environnement

Nettoyer les nichoirs et les installer

Traitement

Pêcher

Si vos pêchers ont été atteints par la cloque, n'oubliez pas de les traiter. Les traitements de février permettent de réduire la quantité de spores. Cependant il vous faudra impérativement intervenir au débourrement et 6 à 10 jours plus tard (selon la météo) avec le même produit pour avoir une action efficace.

Le 1er traitement à mi et le second à fin février avec du Thirame (produit de synthèse) est très efficace.

Pour les personnes qui désirent prendre la voie du bio, le produit à conseiller est le cuivre sous forme d'hydroxyde ou d'oxychlorure.

Pour les amateurs, il est aussi possible à la fin juin de couper les rameaux atteints et de les brûler. Ce qui diminue l'inoculum pour l'année suivante. Pour vous rassurer, les arbres qui ont terminé leur phase de jeunesse (en général vers la 7ème année) deviennent généralement un peu moins sujets à ces attaques.

Poirier

Si vos poiriers sont atteints du psylle alors il faudrait commencer dès le stade B (bourgeons gonflent) en février mais pas en dessous de 10 à 12° d'un traitement d'un produit de Biocontrol qui s'appelle Surround WP ou alors traiter dès le démarrage de la végétation avec du permanganate de potassium (3g/l).