

|| JUIN

Taille

Eclaircissage des pommiers, poiriers et pêchers.

Enlever des fruits permet d'en avoir des plus beaux et évite la casse des branches dû au poids !

Il est possible d'enlever les gourmands poussés à la suite de la taille afin de diminuer le travail de l'hiver prochain.

Environnement

Nettoyer les nichoirs et les installer

Traitement

Pêcher

Continuer la prévention tavelure avec Mycosin + Souffre ou ce que vous aviez utilisé le mois passé.

Pour toutes les larves (carpo et pucerons...) Siva 50% ou Natural 2%.

Les larves du carpocapse quittent les fruits à partir de la mi-juin et descendent le long des troncs à la recherche d'un abri ou accomplir leur métamorphose, dans une anfractuosit  de l' corce ou au sol dans les herbes.

Vers le 15 juin, enrouler autour du tronc deux tours de carton ondul . La bande de carton de 15 cm de hauteur devra comporter des ondulations d'au moins 4 mm pour que les larves y forment leurs cocons.

Au bout de 3 semaines, relever les bandes pi ge qui contiennent les nymphes et les br ler apr s avoir laiss  s' chapper les perce-oreilles, qui aiment bien s'y r fugier.

Renouveler les pi ges toutes les 3 semaines, jusqu'  la mi-septembre, pour capturer les g n rations successives.

Cette m thode est un peu contraignante mais efficace !!! sinon

Une alternative est la mac ration sur 1 jour de rhubarbe et absinthe (500 gr de feuilles sans les tiges dans 3 lt.). Appliquer 3 traitements en 3 jours.